


Porcentaje de personas adultas que reportan medición de colesterol en la sangre, según sexo, edad y resultado. México, 2012

Grupo de edad (años)	Hombre			Mujer			Todos		
	Sí, normal	Sí, alto	No	Sí, normal	Sí, alto	No	Sí, normal	Sí, alto	No
20 a 29	24.6	3.7	70.6	30.9	3.5	64.9	27.8	3.6	67.7
30 a 39	34.6	9.0	55.2	39.1	8.8	51.6	37.0	8.9	53.3
40 a 49	38.1	16.7	44.4	40.9	17.8	40.4	39.6	17.3	42.3
50 a 59	41.7	19.7	37.7	43.4	27.1	28.5	42.6	23.5	33.0
60 a 69	42.5	20.2	36.4	42.0	28.7	28.2	42.2	24.7	32.0
70 a 79	48.1	14.6	35.0	45.3	19.8	33.2	46.6	17.4	34.0
80 y más	48.5	7.8	40.8	45.3	13.7	36.7	46.8	11.0	38.5
Total	35.1	11.7	52.0	38.6	14.4	46.4	37.0	13.0	49.1

Frecuencia en miles


Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). Resultados Nacionales, 2012.

Distribución de los casos de hipertensión arterial por grupo de edad y sexo. México, 2012



Fuente: ENSANUT. Resultados Nacionales, 2012.

Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón Mujeres y hombres. México, 2000-2008, 2011



Fuentes:
 2000-2008 Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), 2008
 2011 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Defunciones generales de hombres por principales causas de mortalidad, 2011.
 INEGI. Defunciones generales de mujeres por principales causas de mortalidad, 2011.

Prevalencia de hipertensión arterial en México, 2011

	Mujeres	Hombres
2006	31.1%	32.4%
2012	30.8%	33.3%


Fuente: ENSANUT, 2011

Mujeres en riesgo de enfermedad isquémica en México

- Mayores de 40 años con hipertensión arterial o dislipidemia (colesterol elevado) en riesgo cardiovascular **8.27 millones**
- Mayores de 35 años con hipertensión arterial que ignoran que tienen el padecimiento o que no alcanzan las metas del tratamiento **2.04 millones**
- Mayores de 35 años con altos niveles de colesterol que ignoran que tienen esta enfermedad o no alcanzan las metas de tratamiento **2.78 millones**

Fuente: Entorno Médico [Revista en internet]. Salvemos el corazón de las mujeres 2012 [Consultado 18 abril 2013]. Disponible en: <http://inicio.entornomedico.org/index.php/119-noticias-astrazeneca/118-salvemos-el-corazon-de-las-mujeres>

Mortalidad por cáncer de próstata, según entidad federativa. México, 2008



Fuente: Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud. Elaborado a partir de la base de datos de defunciones 1979-2008 INEGI/SSA
Tasa por 100 000 habitantes estandarizada por el método de la OMS

Casos de cáncer en genitales masculinos en México, 2004-2006

1 060	Pene
22 229	Próstata
4 018	Testículos
34	Otros órganos genitales

Fuente: Perfil epidemiológico de tumores malignos en México, SSA. Junio de 2011

Porcentaje de hombres de 20 años o más que acudieron en los 12 meses previos a practicarse la prueba de tacto rectal

2.5%

Fuente: ENSANUT, 2012

Porcentaje de hombres de 60 años o más que se realizaron la prueba de detección de cáncer de próstata por antígeno prostático

9.5%

Fuente: ENSANUT, 2012

Casos nuevos de tumor maligno de pene, próstata y testículo atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología durante el periodo 2002-2012

Tumor maligno de	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pene	19	10	8	14	20	18	17	17	16	21	23
Próstata	104	94	91	96	138	121	160	119	178	190	245
Testículo	170	156	158	134	163	144	149	171	178	210	226

Mortalidad relacionada con tumor maligno de pene, próstata y testículo en el Instituto Nacional de Cancerología durante el periodo 2002-2012

Tumor maligno de	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pene	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	1
Próstata	5	3	2	2	2	2	1	3	6	5	2
Testículo	11	17	14	14	16	14	13	20	10	17	16

Fuente: Departamento de Archivo Clínico y Bioestadística, Instituto Nacional de Cancerología, 2013