

RECUERDA

LA PRUEBA DE VPH ES TOTALMENTE
GRATUITA

SE REALIZA EN LAS UNIDADES
DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

EL RESULTADO DE TU PRUEBA ES
CONFIDENCIAL.

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCIÓN
POR *VPH*, ES IMPORTANTE UTILIZAR
SIEMPRE CONDÓN.

INFORMAR A TU PAREJA LOS RESULTADOS
DE LA PRUEBA DEL *VPH* ES TU DECISIÓN.

Para mayor información acude a la unidad de salud.

cnegrs.salud.gob.mx

PRUEBA DE DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)



¿Qué es el VPH?

Es una familia de virus que pueden infectar las células de la piel y el revestimiento de los genitales. Algunos tipos, llamados de bajo grado producen verrugas genitales. Los tipos conocidos como de alto grado pueden ocasionar cáncer del cuello del útero.

La infección por VPH, se transmite por contacto sexual no protegido e infecta a 8 de cada 10 personas de ambos sexos en algún momento de su vida, sin embargo, en el 99% de los casos el cuerpo elimina la infección sin tratamiento.

Algunos factores como el tabaquismo, uso a largo plazo de anticonceptivos orales, y otras infecciones de transmisión sexual favorecen la persistencia de la infección por VPH y su evolución a cáncer.

¿Cómo saber si tengo Infección por VPH?

La mayoría de los casos no presentan síntomas, ni alteraciones visibles, por lo que es importante realizar la Prueba del VPH para identificar a las mujeres con riesgo de desarrollar cáncer de cuello del útero.

¿Qué es la Prueba VPH?

Es una prueba que detecta la presencia de los tipos de virus de alto riesgo, en una muestra obtenida del cuello del útero con la finalidad de identificar las que están en riesgo de desarrollar cáncer. Este estudio se realiza en mujeres de 35 a 64 años de edad y es necesario NO estar menstruando para realizarla.



¿Cómo interpretar el resultado de la Prueba del VPH?

Un resultado negativo, significa que no hay infección y por lo tanto no hay posibilidad de desarrollar cáncer del cuello del útero. En este caso se debe realizar nuevamente la prueba dentro de cinco años.

Un resultado positivo significa que hay infección por el virus, por lo que se requiere una valoración adicional con un Papanicolaou para identificar si la infección ha producido cambios. El personal de salud te indicará los pasos a seguir.